

		2.2.18.2 Kasus Malnutrisi dewasa dan anak : evaluasi sistem tubuh, hilang massa otot dan lemak subkutan, nafsu makan dan pengaruhnya				
		2.2.18.3 Wasting syndrome pada HIV (tanda penurunan BB >10%, diare lebih dari 1 bulan, demam dan lemah)				
	2.3	Mengkaji riwayat terkait makanan dan gizi				
		2.3.1 Pengkajian asupan makanan dan zat gizi, termasuk komposisi dan kecukupan gizi, pola-pola makan dan snack, alergi dan intoleransi terhadap jenis makanan tertentu pada semua kasus : 2.3.1.1. Semua kasus : pengkajian makanan dan gizi dibandingkan dengan standar rujukan 2.3.1.2. Kasus Neonatus : kecukupan asupan sodium, phosphat dan vitamin larut lemak (A, D dan E). 2.3.1.3. Kasus anak : jenis/jumlah makanan, minuman, ASI, formula yang dikonsumsi pada saat makan/snack, bila menyusui (jumlah, lama, jumlah wet diapers, pemberian suplemen. 2.3.1.4. Kasus malnutrisi : asupan energi dan protein $\leq$ 50% dari kebutuhan selama $\geq$ 5 hari, sampai dengan asupan energi dan protein $<$ 75% dari kebutuhan selama $\geq$ 3 bulan				4
		2.3.2 Pengkajian pemberian zat gizi dan makanan (seperti diet saat ini dan yang lalu, preskripsi diet, modifikasi makanan, lingkungan makan, dan pemberian nutrisi enteral dan parenteral)				4
		2.3.3 Pengkajian substansi bioaktif				4
		2.3.4 Pengkajian penggunaan obat dan makanan (termasuk preskripsi dan				4